

# **Diskrete strukture 1**

8. čas: Uređenja. Funkcije.

---

## Donje ograničenje i infimum

**Definicija.** Neka je  $\leqslant$  uređenje na  $S$ ,  $A \subseteq S$  i  $a \in S$ :

- $a$  je donje ograničenje skupa  $A$  ako  $(\forall x \in A) a \leqslant x$ ;
- $a$  je infimum skupa  $A$  ako je  $a$  najveći element skupa donjih ograničenja od  $A$ .

Dualno definišemo gornje ograničenje i supremum.

**Komentar.** Ako  $A$  ima najmanji element  $a$ , onda je  $a$  i infimum od  $A$ .

Definišemo uređenje  $\leqslant$  na  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$  sa:

$$(x_1, y_1) \leqslant (x_2, y_2) : \Leftrightarrow x_1 \leqslant x_2 \wedge y_1 \leqslant y_2.$$

Odrediti značajne elemente sedećih figura:

- trougla sa temenima  $A(-1, -1)$ ,  $B(1, -2)$  i  $C(0, 2)$ ;
- trougla sa temenima  $A(-1, 1)$ ,  $B(1, -1)$  i  $C(1, 2)$ ;
- kruga  $x^2 + y^2 \leqslant 1$ .

## Funkcionalne relacije

**Definicija.** Relacija  $f \subseteq A \times B$  je *funkcionalna* ako:

$$(\forall a \in A, b_1, b_2 \in B)(a f b_1 \wedge a f b_2 \rightarrow b_1 = b_2),$$

tj. iz svakog elementa  $a \in A$  izlazi najviše jedna  $f$ -strelica.

U slučaju da  $f \subseteq A \times B$  jeste funkcionalna relacija, ako za  $a \in A$  postoji jedinstveni element  $b \in B$  takav da  $a f b$ , obeležavamo ga sa  $b = f(a)$  – *slika* elementa  $a$ . Ako za  $a \in A$  takav element ne postoji, pišemo  $f(a) = \uparrow$ .

*Domen* funkcionalne relacije  $f \subseteq A \times B$  je skup:

$$\text{Dom}(f) = \{a \in A \mid (\exists b \in B) b = f(a)\},$$

a *slika* je skup:

$$\text{Im}(f) = \{f(a) \mid a \in \text{Dom}(f)\}.$$

## Primeri

**Primer.** Da li su relacije  $f = \{(x, x^2) \mid x \in \mathbb{R}\}$ ,  
 $g = \{(x^2, x) \mid x \in \mathbb{R}\}$ ,  $h = \{(x^2, x) \mid x \geq 0\}$  i  $k = \{(x^2, x) \mid x \leq -2\}$  funkcionalne relacije na  $\mathbb{R}$ ?

**Komentar.** Ako su  $f \subseteq A \times B$  i  $g \subseteq B \times C$  funkcionalne, onda je i  $g \circ f \subseteq A \times C$  funkcionalna. Takođe,  $g \circ f(a)$  postoji akko postoje  $f(a)$  i  $g(f(a))$ , i važi  $g \circ f(a) = g(f(a))$ .

**Primeri.** Konstruisati primere  $f \subseteq A \times B$  i  $g \subseteq B \times C$  takve da:

- $g \circ f$  i  $g$  jesu, ali  $f$  nije funkcionalna;
- $g \circ f$  i  $f$  jesu, ali  $g$  nije funkcionalna;
- $g \circ f$  jeste, ali  $f$  i  $g$  nisu funkcionalne.

# Funkcije

**Definicija.** Funkcija iz  $A$  u  $B$ , u oznaci  $f: A \rightarrow B$ , je relacija  $f \subseteq A \times B$  za koju važi:

- $f$  je funkcionalna relacija i •  $\text{Dom}(f) = A$ ,

tj. ako  $(\forall a \in A)(\exists_1 b \in B) a f b$ .

Skup  $A$  je *domen*, a  $B$  je *kodomen* funkcije  $f$ .

Funkcija  $f: A \rightarrow B$  je *injekcija* ili *1-1* ako:

$(\forall a_1, a_2 \in A)(a_1 \neq a_2 \rightarrow f(a_1) \neq f(a_2))$  ili ekvivalentno:

$(\forall a_1, a_2 \in A)(f(a_1) = f(a_2) \rightarrow a_1 = a_2)$ .

Funkcija  $f: A \rightarrow B$  je *surjekcija* ili *na*, ako je  $\text{Im } f = B$ , tj. ako:

$(\forall b \in B)(\exists a \in A) b = f(a)$ .

Funkcija je *bijekcija* ako je 1-1 i na.

## Primeri

**Primer.** Da li je funkcija  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  data sa  $f(n) = n + (-1)^n$  1-1 ili na?

**Primer.** Dati primer funkcije  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  koja je:

- 1-1, ali nije na;
- na, ali nije 1-1.

**Primer.** Ako  $f: A \rightarrow B$  i  $g: B \rightarrow C$ , onda  $g \circ f: A \rightarrow C$ .

# Osobine kompozicije

**Tvrđenje.** Neka  $f: A \rightarrow B$  i  $g: B \rightarrow C$ . Tada:

- ako su  $f$  i  $g$  1-1, onda je i  $g \circ f$  1-1;
- ako su  $f$  i  $g$  na, onda je i  $g \circ f$  na;
- ako su  $f$  i  $g$  bijekcije, onda je i  $g \circ f$  bijekcija;
- ako je  $g \circ f$  1-1, onda je i  $f$  1-1;
- ako je  $g \circ f$  na, onda je i  $g$  na.

**Primer.** Dati primer funkcija takvih da:

- $g \circ f$  je bijekcija,  $f$  nije na i  $g$  nije 1-1.

**Tvrđenje.** Neka  $f: A \rightarrow B$ .

- $f^{-1} \subseteq B \times A$  je funkcionalna akko  $f$  je 1-1;
- $f^{-1} : B \rightarrow A$  akko  $f$  je bijekcija.

**Definicija.** *Identiteta* na  $A$  je  $\text{id}_A : A \rightarrow A$  data sa  $\text{id}_A(a) = a$  – očigledno je bijekcija.

**Definicija.** Neka je  $f: A \rightarrow B$ . Funkcija  $g: B \rightarrow A$  je:

- levi inverz od  $f$  ako  $g \circ f = \text{id}_A$ ;
- desni inverz od  $f$  ako  $f \circ g = \text{id}_B$ ;
- inverz ako je i levi i desni inverz.

## Primeri

### Primer.

- Naći neki levi inverz funkcije  $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  date da  $f(m) = 2m$ .
- Naći neki desni inverz funkcije  $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  date sa  $f(m) = \lfloor \frac{m}{2} \rfloor$ .

**Teorema.** Neka je  $f: A \rightarrow B$ .

- $f$  ima levi inverz akko  $f$  je 1-1;
- $f$  ima desni inverz akko  $f$  je na;
- $f$  ima inverz akko  $f$  je bijekcija. Inverz je jedinstven i zapravo jednak  $f^{-1}$ .