

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Геометрија И–смер

део 8: Безијерове криве, циклоиде и фрактали

Тијана Шукиловић

6. децембар 2020

Безијерове криве

Дефиниција 1.1

Нека су $P_0, P_1 \dots P_n$, $n \geq 2$ тачке равни. Безијерова крива степена n је:

$$\alpha_n(t) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} t^i (1-t)^{n-i} P_i = \sum_{i=0}^n B_i^n(t) P_i, \quad t \in [0, 1].$$

Тачке P_i називају се **контролне тачке**, а полиноми $B_i(t)$ **Бернштајнови полиноми** или **базне функције**.

Полигонска линија $P_0 P_1 \dots P_n$ се зове **контролна полигонска линија**.

Безијерове криве на прозивољном интервалу

- $t \in [0, 1]$:

$$\alpha_n(t) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} t^i (1-t)^{n-i} P_i = \sum_{i=0}^n B_i^n(t) P_i.$$

Безијерове криве на прозивољном интервалу


- $t \in [0, 1]$:

$$\alpha_n(t) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} t^i (1-t)^{n-i} P_i = \sum_{i=0}^n B_i^n(t) P_i.$$

- $u \in [a, b]$:

$$\alpha_n(u) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} \left(\frac{u-a}{b-a}\right)^i \left(\frac{b-u}{b-a}\right)^{n-i} P_i.$$

Беџијерове криве 2. и 3. степена




Слика 1: Беџијерове криве степена 2 и 3

Крива 2. степена одређена је са три контролне тачке:

$$\alpha_2(t) = (1 - t)^2 P_0 + 2t(1 - t)P_1 + t^2 P_2, \quad t \in [0, 1];$$

Безијерове криве 2. и 3. степена



Слика 1: Безијерове криве степена 2 и 3

Крива 2. степена одређена је са три контролне тачке:

$$\alpha_2(t) = (1 - t)^2 P_0 + 2t(1 - t)P_1 + t^2 P_2, \quad t \in [0, 1];$$

Крива 3. степена одређена је са четири контролне тачке:

$$\alpha_3(t) = (1 - t)^3 P_0 + 3t(1 - t)^2 P_1 + 3t^2(1 - t)P_2 + t^3 P_3, \quad t \in [0, 1].$$

Матрична репрезентација Безијерове криве

$$\alpha_2(t) = (1, t, t^2) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_0 \\ P_1 \\ P_2 \end{pmatrix}.$$

Пример 1

Извести формуле матричне репрезентације кубне Безијерове криве.

Особине

- $\deg \alpha_n = n$.

Особине

- $\deg \alpha_n = n$.
- $\alpha_n(0) = P_0, \quad \alpha_n(1) = P_n$.

Особине

- $\deg \alpha_n = n$.
- $\alpha_n(0) = P_0$, $\alpha_n(1) = P_n$.
- Тангентни вектор у P_0 је $\overrightarrow{P_0P_1}$, а у P_n је $\overrightarrow{P_{n-1}P_n}$.

Особине

- $\deg \alpha_n = n$.
- $\alpha_n(0) = P_0$, $\alpha_n(1) = P_n$.
- Тангентни вектор у P_0 је $\overrightarrow{P_0P_1}$, а у P_n је $\overrightarrow{P_{n-1}P_n}$.
- $P_k \rightarrow P_k + \vec{v}$: $\bar{\alpha}_n(t) = \alpha_n(t) + B_{n,k}(t)\vec{v}$.

Особине

- $\deg \alpha_n = n$.
- $\alpha_n(0) = P_0$, $\alpha_n(1) = P_n$.
- Тангентни вектор у P_0 је $\overrightarrow{P_0P_1}$, а у P_n је $\overrightarrow{P_{n-1}P_n}$.
- $P_k \rightarrow P_k + \vec{v}$: $\bar{\alpha}_n(t) = \alpha_n(t) + B_{n,k}(t)\vec{v}$.
- Особина ненегативности.

Особине

- $\deg \alpha_n = n$.
- $\alpha_n(0) = P_0$, $\alpha_n(1) = P_n$.
- Тангентни вектор у P_0 је $\overrightarrow{P_0P_1}$, а у P_n је $\overrightarrow{P_{n-1}P_n}$.
- $P_k \rightarrow P_k + \vec{v} : \bar{\alpha}_n(t) = \alpha_n(t) + B_{n,k}(t)\vec{v}$.
- Особина ненегативности.
- Особина конвексног омотача.

Особине

- $\deg \alpha_n = n$.
- $\alpha_n(0) = P_0, \quad \alpha_n(1) = P_n$.
- Тангентни вектор у P_0 је $\overrightarrow{P_0P_1}$, а у P_n је $\overrightarrow{P_{n-1}P_n}$.
- $P_k \rightarrow P_k + \vec{v} : \quad \bar{\alpha}_n(t) = \alpha_n(t) + B_{n,k}(t)\vec{v}$.
- Особина ненегативности.
- Особина конвексног омотача.
- Особина мање варијације.

Особине

- $\deg \alpha_n = n$.
- $\alpha_n(0) = P_0, \quad \alpha_n(1) = P_n$.
- Тангентни вектор у P_0 је $\overrightarrow{P_0P_1}$, а у P_n је $\overrightarrow{P_{n-1}P_n}$.
- $P_k \rightarrow P_k + \vec{v} : \quad \bar{\alpha}_n(t) = \alpha_n(t) + B_{n,k}(t)\vec{v}$.
- Особина ненегативности.
- Особина конвексног омотача.
- Особина мање варијације.
- Афина инваријантност.

Особине

- $\deg \alpha_n = n$.
- $\alpha_n(0) = P_0, \quad \alpha_n(1) = P_n$.
- Тангентни вектор у P_0 је $\overrightarrow{P_0P_1}$, а у P_n је $\overrightarrow{P_{n-1}P_n}$.
- $P_k \rightarrow P_k + \vec{v} : \quad \bar{\alpha}_n(t) = \alpha_n(t) + B_{n,k}(t)\vec{v}$.
- Особина ненегативности.
- Особина конвексног омотача.
- Особина мање варијације.
- Афина инваријантност.

Теорема 1.1

Беџијерова крива степена два је део параболе.

Де-Кастељау алгоритам

Одређивање тачке на кривој $\alpha_n(t)$ за неко $t \in [0, 1]$:

① $P_{00} = P_0, P_{01} = P_1, \dots, P_{0n-1} = P_{n-1}, P_{0n} = P_n$

Де-Кастељау алгоритам

Одређивање тачке на кривој $\alpha_n(t)$ за неко $t \in [0, 1]$:

- 1 $P_{00} = P_0, P_{01} = P_1, \dots, P_{0n-1} = P_{n-1}, P_{0n} = P_n$
- 2 $P_{1i} = (1 - t)P_{0i} + tP_{0i+1}, i = 0, \dots, n - 1$

Де-Кастељау алгоритам

Одређивање тачке на кривој $\alpha_n(t)$ за неко $t \in [0, 1]$:

① $P_{00} = P_0, P_{01} = P_1, \dots, P_{0n-1} = P_{n-1}, P_{0n} = P_n$

② $P_{1i} = (1 - t)P_{0i} + tP_{0i+1}, i = 0, \dots, n - 1$

⋮

Де-Кастељау алгоритам

Одређивање тачке на кривој $\alpha_n(t)$ за неко $t \in [0, 1]$:

① $P_{00} = P_0, P_{01} = P_1, \dots, P_{0n-1} = P_{n-1}, P_{0n} = P_n$

② $P_{1i} = (1 - t)P_{0i} + tP_{0i+1}, i = 0, \dots, n - 1$

⋮

③ $P_{ki} = (1 - t)P_{k-1i} + tP_{k-1i+1}, i = 0, \dots, n - k$

Де-Кастељау алгоритам

Одређивање тачке на кривој $\alpha_n(t)$ за неко $t \in [0, 1]$:

① $P_{00} = P_0, P_{01} = P_1, \dots, P_{0n-1} = P_{n-1}, P_{0n} = P_n$

② $P_{1i} = (1-t)P_{0i} + tP_{0i+1}, i = 0, \dots, n-1$

⋮

③ $P_{ki} = (1-t)P_{k-1i} + tP_{k-1i+1}, i = 0, \dots, n-k$

④ $P_{n0} = (1-t)P_{n-10} + tP_{n-11}$

Де-Кастељау алгоритам

Одређивање тачке на кривој $\alpha_n(t)$ за неко $t \in [0, 1]$:

① $P_{00} = P_0, P_{01} = P_1, \dots, P_{0n-1} = P_{n-1}, P_{0n} = P_n$

② $P_{1i} = (1-t)P_{0i} + tP_{0i+1}, i = 0, \dots, n-1$

⋮

③ $P_{ki} = (1-t)P_{k-1i} + tP_{k-1i+1}, i = 0, \dots, n-k$


④ $P_{n0} = (1-t)P_{n-10} + tP_{n-11}$

$P_{n-10}P_{n-11}$ – тангента на криву у тачки t

Де-Кастељау алгоритам

Пример 2

Показати да је де-Кастељау алгоритам коректан.




Слика 2: Де-Кастељау алгоритам за криву 5. степена и $t = 0.4$

- Цртање криве 5. степена

Подела криве на два дела


Криву α делимо на две криве α_1 и α_2 :

$$\begin{aligned}\alpha_1 &: P_0 = P_{00}, P_{10}, P_{20}, \dots, P_{n0} = \alpha(t), \\ \alpha_2 &: \alpha(t) = P_{n0}, P_{n-11}, P_{n-22}, \dots, P_{0n} = P_n.\end{aligned}$$



Слика 3: Подела криве на два дела

Глатко спајање кривих




Слика 4: Глатко спајање кривих

Повећање степена криве

$$\alpha_n(t) : P_0, \dots, P_n, \quad \bar{\alpha}_{n+1}(t):$$

$$Q_0 = P_0, \quad Q_i = \frac{i}{n+1}P_{i-1} + \left(1 - \frac{i}{n+1}\right)P_i, \quad 1 \leq i \leq n, \quad Q_{n+1} = P_n.$$




Слика 5: Повећање степена Безијерове криве

Повећање степена криве

$$\alpha_n(t) : P_0, \dots, P_n, \quad \bar{\alpha}_{n+1}(t):$$

$$Q_0 = P_0, \quad Q_i = \frac{i}{n+1}P_{i-1} + \left(1 - \frac{i}{n+1}\right)P_i, \quad 1 \leq i \leq n, \quad Q_{n+1} = P_n.$$




Слика 5: Повећање степена Безијерове криве

Повећање степена криве

$$\alpha_n(t) : P_0, \dots, P_n, \quad \bar{\alpha}_{n+1}(t):$$

$$Q_0 = P_0, \quad Q_i = \frac{i}{n+1}P_{i-1} + \left(1 - \frac{i}{n+1}\right)P_i, \quad 1 \leq i \leq n, \quad Q_{n+1} = P_n.$$




Слика 5: Повећање степена Безијерове криве

Повећање степена криве

$$\alpha_n(t) : P_0, \dots, P_n, \quad \bar{\alpha}_{n+1}(t):$$

$$Q_0 = P_0, \quad Q_i = \frac{i}{n+1}P_{i-1} + \left(1 - \frac{i}{n+1}\right)P_i, \quad 1 \leq i \leq n, \quad Q_{n+1} = P_n.$$




Слика 5: Повећање степена Беџијерове криве

Повећање степена криве

$$\alpha_n(t) : P_0, \dots, P_n, \quad \bar{\alpha}_{n+1}(t):$$

$$Q_0 = P_0, \quad Q_i = \frac{i}{n+1}P_{i-1} + \left(1 - \frac{i}{n+1}\right)P_i, \quad 1 \leq i \leq n, \quad Q_{n+1} = P_n.$$




Слика 5: Повећање степена Беџијерове криве

Повећање степена криве

$$\alpha_n(t) : P_0, \dots, P_n, \quad \bar{\alpha}_{n+1}(t):$$

$$Q_0 = P_0, \quad Q_i = \frac{i}{n+1}P_{i-1} + \left(1 - \frac{i}{n+1}\right)P_i, \quad 1 \leq i \leq n, \quad Q_{n+1} = P_n.$$



Слика 5: Повећање степена Беџијерове криве

Примери

Пример 3

- а) Одредити Безијерову криву $\alpha_2(t)$ чије су контролне тачке $P_0(1, 1)$, $P_1(-1, 0)$, $P_2(1, -1)$.
- б) Одредити једначину тангенте на криву $\alpha_2(t)$ у тачки $t_0 = 0.5$ и показати да је тангента паралелна са правом P_0P_2 .
- в) Повећати степен криве за 1.
- г) Одредити једначину тангенте на криву $\bar{\alpha}_3(t)$ у тачки $t_0 = 0.5$. Да ли је тангента паралелна са правом $\bar{P}_0\bar{P}_3$?

Рационалне Безијерове (RB) криве


Рационална Безијерова крива степена n са контролним тачкама P_0, \dots, P_n и тежинама $\omega_0, \dots, \omega_n > 0$ је дата параметризацијом:

$$r_n(t) = \frac{\sum_{i=0}^n \omega_i B_{i,n}(t) P_i}{\sum_{i=0}^n \omega_i B_{i,n}(t)}, \quad t \in [0, 1],$$

где су $B_{i,n}(t)$ Бернштајнови полиноми.

Део круга као RB-крива

Пример 4



Слика 6: Четвртина круга: $x = \cos \theta, y = \sin \theta, \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

као RB-крива: $x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, y = \frac{2t}{1+t^2}, t \in [0, 1].$

Циклоиде

- кинематички метод задавања криве
- циклоиде = настају котрљањем круга по некој другој кривој

Циклоиде


- кинематички метод задавања криве
- циклоиде = настају котрљањем круга по некој другој кривој
- параметарска једначина циклоиде (основне):

$$x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t), \quad t \in \mathbb{R}$$

Циклоиде

- кинематички метод задавања криве
- циклоиде = настају котрљањем круга по некој другој кривој
- параметарска једначина циклоиде (основне):

$$x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t), \quad t \in \mathbb{R}$$




Слика: Скраћена циклоида

Циклоиде

- кинематички метод задавања криве
- циклоиде = настају котрљањем круга по некој другој кривој
- параметарска једначина циклоиде (основне):


$$x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t), \quad t \in \mathbb{R}$$



Слика: Продужена циклоида

Епициклоиде


- путања круга који се без клизања котрља **СПОЉНОМ** страном непокретног круга
- m = однос полупречника покретног и непокретног круга



Слика: Епициклоида $m = 2$

Епициклоиде

- путања круга који се без клизања котрља **СПОЉНОМ** страном непокретног круга
- m = однос полупречника покретног и непокретног круга



Слика: Епициклоида $m = 1$

Епициклоиде

- путања круга који се без клизања котрља **СПОЉНОМ** страном непокретног круга
- m = однос полупречника покретног и непокретног круга



Слика: Епициклоида $m = \frac{1}{5}$

Епициклоиде

- путања круга који се без клизања котрља **СПОЉНОМ** страном непокретног круга
- m = однос полупречника покретног и непокретног круга



Слика: Епициклоида $m = \frac{2}{3}$

Епициклоиде


- путања круга који се без клизања котрља **СПОЉНОМ** страном непокретног круга
- m = однос полупречника покретног и непокретног круга



Слика: Епициклоида $m = \frac{3}{5}$

Хипоциклоиде


- путања круга који се без клизања котрља **СПОЉНОМ** страном непокретног круга
- m = однос полупречника покретног и непокретног круга



Слика: Хипоциклоида $m = \frac{1}{7}$

Хипоциклоиде


- путања круга који се без клизања котрља **СПОЉНОМ** страном непокретног круга
- m = однос полупречника покретног и непокретног круга



Слика: Хипоциклоида $m = \frac{1}{4}$

Хипоциклоиде


- путања круга који се без клизања котрља **СПОЉНОМ** страном непокретног круга
- m = однос полупречника покретног и непокретног круга



Слика: Хипоциклоида $m = \frac{2}{5}$

Хипоциклоиде


- путања круга који се без клизања котрља **СПОЉНОМ** страном непокретног круга
- m = однос полупречника покретног и непокретног круга



Слика: Хипоциклоида $m = \frac{1}{2}$

Хипоциклоиде


- путања круга који се без клизања котрља **СПОЉНОМ** страном непокретног круга
- m = однос полупречника покретног и непокретног круга



Слика: Хипоциклоида $m = \frac{2}{3}$

Хипоциклоиде


- путања круга који се без клизања котрља **СПОЉНОМ** страном непокретног круга
- m = однос полупречника покретног и непокретног круга



Слика: Хипоциклоида $m = \frac{5}{7}$

Брахистохрона

- брахистохрона = крива која спаја тачке S и C таква да је време спушта из S до C најкраће




Слика 10: Крива најбржег спушта

Пример 5

Упоредити времена кретања низ стрме равни $S - C$, $S - A - C$ и низ брахистохрону која спаја тачке S и C .

Фрактали

Фрактал = геометријски лик који се може разложити на мање делове тако да је сваки од њих, макар приближно, умањена копија целине.




Слика: Музеј Илузија, Београд¹

¹преузето са: <https://www.muzejiluzija.rs/eksponat/kaleidoskop/>

Фрактали

Фрактал = геометријски лик који се може разложити на мање делове тако да је сваки од њих, макар приближно, умањена копија целине.



Слика: Музеј Илузија, Београд¹

¹преузето са: <https://www.muzejiluzija.rs/ekspонат/kaleidoskop/>

Фрактали

Фрактал = геометријски лик који се може разложити на мање делове тако да је сваки од њих, макар приближно, умањена копија целине.



Слика: Музеј Илузија, Београд¹

¹преузето са: <https://www.muzejiluzija.rs/ekspонат/kaleidoskop/>

Фрактали

Фрактал = геометријски лик који се може разложити на мање делове тако да је сваки од њих, макар приближно, умањена копија целине.



Слика: Печуј, 2011

Фрактали

Фрактал = геометријски лик који се може разложити на мање делове тако да је сваки од њих, макар приближно, умањена копија целине.

Подела фрактала:


- 1) 2) 3) стохастички

Фрактали

Фрактал = геометријски лик који се може разложити на мање делове тако да је сваки од њих, макар приближно, умањена копија целине.

Подела фрактала:

- 1) геометријски
- 2) алгебарски
- 3) стохастички



Слика: Питагорино дрво¹


¹извор: Wikipedia

Фрактали

Фрактал = геометријски лик који се може разложити на мање делове тако да је сваки од њих, макар приближно, умањена копија целине.

Подела фрактала:


- 1) геометријски
- 2) алгебарски
- 3) стохастички



Слика: Жулијин скуп¹


Геометријски фрактали

- Геометријски фрактал = самослична фигура чији се општи облик задаје генератором.




Слика 13: Прве четири итерације Кохове криве

Пеанова крива



Слика 14: Прве три итерације Пеанове криве


Хилбертова крива



Слика 15: Прве три итерације Хилбертове криве

Примена геометрисјких фрактала

Примена: када је потребно линеаризовати вишедимензионе податке јер представљају оптималан начин да се вишедимензиони скупови пресликају на једнодимензионе низове.



Слика 16: Прве две итерације тродимензионе Хилбертове криве