

Ка модерној алгебри 2; почеци теорије скупова

Зоран Петровић

8. мај 2023. године

Гаус



Слика 1: Карл Фридрих Гаус

Карл Фридрих Гаус (1777–1855) свакако је био један од најзначајнијих математичара у историји, а имао је немале доприносе и у астрономији и физици. Овде ћемо се посветити његовим најважнијим доприносима нашој теми, а то је, најпре, комплетно решење циклотомичне једначине $x^n - 1 = 0$, а затим и резултатом да сваки реалан полином може да се факторише на линеарне и квадратне факторе, што пак повлачи „основну теорему алгебре”: сваки полином са комплексним кофицијентима може да се факторише на линеарне факторе.

Почнимо од „једначине деобе круга” $x^n - 1 = 0$. Још као студент математике, Гаус је дошао до изванредног открића, које је најавио, помало неочекивано, у литерарном часопису који је излазио у Јени. Ево његове најаве (када каже да се могу геометријски конструисати

мисли на то да се могу конструисати искључиво користећи лењир и шестар) од априла 1796. године.

Познато је сваком почетнику у геометрији да су разни правилни многоуглови попут троугла, четвороугла, петоугла, петнаестоугла, као и они који се добијају непрекидним удвостручавањем страна претходних, могу геометријски конструисати.

То је већ урађено у време Еуклида и, чини се, генерално се каже да се поље елементарне геометрије не продужава даље: бар ја не знам ни за један успешан покушај да се њене границе продуже у том правцу.

Стога ми се чини да откриће да, сем наведених правилних многоуглова више њих, на пример 17-оугао допуштају геометријску конструкцију. Ово откриће је само специјалан додатак широј теорији, која још није комплетирана и која ће бити представљена јавности чим буде заокружена.


К. Ф. Гаус из Брауншвајга,
Студент математике у Гетингену

Овај резултат је представио у свом обимном делу „Аритметичка истраживања“ објављеном у лето 1801. године. Заправо је томе била посвећена последња, седма глава овог дела. Претходне главе су биле посвећене теорији бројева.

Он ту показује да, ако је број страна правилног многоугла облика $p_1 p_2 \cdots p_l \cdot 2^k$, где су p_i различити прости бројеви облика $2^{2^n} + 1$ (Фермаови прости бројеви), онда се тај многоугао може конструисати помоћу лењира и шестара (прича се да је он толико био поносан тим својим резултатом да је тражио да му то буде уклесано на надгробну плочу, али да је каменорезац то одбио тврдећи да се таква фигура не би разликовала од круга...). У једном одељку овог дела Гаус наводи да он има исправан метод да докаже да су то једини правилни многоуглови за које је могуће извршити конструкцију помоћу лењира и шестара и да, мада то превазилази границе овог дела, он то наводи због осећаја одговорности за то да други не би губили време покушавајући да овај резултат прошире.

Гаус најпре своди проблем на случај када је n прост број, и у даљем стално претпоставља да је то тако. Најпре, на дosta компликован начин, доказује да је полином $x^{n-1} + x^{n-2} + \cdots + x + 1$ (који он означава са X) нерастављив над рационалним бројевима. Скуп свих корена овог полинома Гаус означава са Ω . Он наводи потом да се идеја доказа састоји у томе да ако је $n-1$ производ фактора $\alpha\beta\gamma\cdots$, који се сви могу сматрати прстим бројевима, онда се једначина $X = 0$ може решити сукцесивним решавањем једначина степена $\alpha, \beta, \gamma, \dots$. На пример, за $n = 17$, $n-1 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$, те за овај случај треба решити четири квадратне једначине.

За доказивање овог резултата, Гаус користи такозване „периоде”. Тачка 347 гласи: Сви корени из Ω разбијају се на неке класе (периоде). Наиме, нека је r неки од корена из Ω . Сматрамо да је n прост. Тада су сви корени заправо $r, r^2, r^3, \dots, r^{n-1}$. Гаус је у трећој глави својих „Истраживања” доказао да ако је n прост број, онда је група $(\mathbb{Z}_n \setminus \{0\}, \cdot)$ циклична, те постоји „примитивни елемент” g који је генератор те групе. Тада су $1, g, g^2, \dots, g^{n-2}$ по модулу n заправо бројеви $1, 2, \dots, n-1$, али не нужно у истом поретку. Стога су $r, r^g, r^{g^2}, \dots, r^{g^{n-2}}$ такође сви корени из Ω при чему је сваки од њих g -ти степен претходног (приметимо да је и $(r^{g^{n-2}})^g = r^{g^{n-1}} = r$ такође степен „претходног” ако их гледамо поређане на кругу). Поставимо те корене из Ω тако да деле круг на n једнаких делова.



Слика 2: Периоди

Они ће чинити темена правилног n -тоугла. Нека је $n-1 = ef$. Размотримо каква својства имају суме од по f тих корена тако да f тих темена која им одговарају чине темена правилног f -тоугла. Такве суме Гаус назива ПЕРИОДИМА дужине f . Ако се у тој суми пође од корена r^λ она је једнака

$$r^\lambda + r^{\lambda h} + r^{\lambda h^2} + \dots + r^{\lambda h^{f-1}},$$

где је $h = g^e$, а овде је сваки члан суме h -ти степен претходног (гледано циклички, тј. и први члан је h -ти степен последњег). Ову суму Гаус означава са (f, λ) . Наравно, може се поћи од било ког темена, те је $(f, \lambda) = (f, \lambda h^k)$. Ако се стави $\lambda = 0$, добија се да је $(f, 0) = f$. И ту суму Гаус назива периодом, мада она нема исти статус као претходне.

Гаус потом доказује низ лема за ове периоде, посебно како се налази формула за производе $(f, \lambda) \cdot (f, \mu)$. На пример, за $n = 19$, тј. $n-1 = 18$ налази:

$$(6, 1)^2 = (6, 2) + (6, 8) + (6, 9) + (6, 12) + (6, 13) + (6, 19)$$

$$= (6, 2) + 2(6, 8) + 2(6, 9) + 6.$$

Без даљег разматрања, наведимо како се ти периоди појављују при формирању наведених помоћних једначина.

Ако је $n = 19$, онда је $n - 1 = 18 = 3 \cdot 3 \cdot 2$. Тада су периоди $(6, 1), (6, 2), (6, 4)$ корени једначине $x^3 + x^2 - 6x - 7 = 0$. Периоди $(2, 1), (2, 8), (2, 7)$ су корени једначине $x^3 - (6, 1)x^2 + ((6, 1) + (6, 4))x - 2 - (6, 2) = 0$, а r, r^{18} су корени једначине $x^2 - (2, 1)x + 1$. Кад имамо r имамо и све остале.

За случај $n = 17$, имамо $n - 1 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$. Периоди $(8, 1), (8, 3)$ су корени једначине $x^2 + x - 4 = 0$; $(4, 1), (4, 9)$ су корени једначине $x^2 - (8, 1)x - 1 = 0$; $(2, 1), (2, 13)$ су корени једначине $x^2 - (4, 1)x + (4, 3) = 0$ и r, r^{16} су корени једначине $x^2 - (2, 1)x + 1$. Тако смо добили те четири квадратне једначине. Како се решења квадратних једначина изражавају помоћу квадратних корена, а њих је могуће конструисати помоћу лењира и шестара (под условом да је поткорена величина већ конструисана), то се и правилни 17-угао може конструисати помоћу лењира и шестара.

Пређимо сада на разматрање основне теореме алгебре. Гаус се више пута враћао на ову теорему. Први доказ је објавио 1799, други и трећи 1816, а четврти 1849. Четврти доказ је базиран на истим идејама као и први, те је он заправо дао три различита доказа овог важног резултата.

Заправо је Гаусова теза, коју је одбранио код Фафа (Pfaff) 1799. у Хелмштету, садржала анализу ове теореме и први доказ. Теза није дуга, има неких 26 страница. Најпре Гаус анализира, уз критику, раније покушаје доказа овог резултата. Најпре се то односи на Даламберов доказ из 1746. године, а потом и на Ојлерову даљу разраду. Имајући у виду критику коју је дао, Гаус у другом делу представља свој доказ.

Гаус разматра полином са реалним коефицијентима

$$X = x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \dots + Lx + M,$$

где је x неодређена. Он жељи да докаже да или линеаран или квадратни фактор од X постоји. Треба приметити да ако одговарајућа једначина има двоструки корен, онда је он, као што знамо, нула и извода тог полинома, па се проблем може свести на полином мањег степена. Стога се може претпоставити да X нема вишеструких корена. Гаус избегава експлицитно коришћење комплексних бројева, што је рађено у претходним доказима и формулише следећу лему.

Ако су величина r и угао φ одређени на такав начин да важе следеће једначине

$$r^m \cos m\varphi + Ar^{m-1} \cos(m-1)\varphi + Br^{m-2} \cos(m-2)\varphi + \dots + Krr \cos 2\varphi + Lr \cos \varphi + M = 0, \quad (1)$$


$$r^m \sin m\varphi + Ar^{m-1} \sin(m-1)\varphi + Br^{m-2} \sin(m-2)\varphi + \dots + Krr \sin 2\varphi + Lr \sin \varphi = 0, \quad (2)$$

онда је функција $x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \dots + KxxLx + M = X$ дељива фактором другог степена $xx - 2\cos\varphi \cdot rx + rr$, ако $r \cdot \sin\varphi$ није $= 0$. Али, ако јесте $r \cdot \sin\varphi = 0$, онда је та функција дељива простим фактором $x - r \cos\varphi$.

Гаус потом образлаже да се овако нешто доказује углавном коришћењем „имагинарних бројева“ и наводи Ојлера, али да он, ето, сматра да је добро видети како се то може и директно доказати. Приметимо да, наравно, у случају када је $r \sin\varphi = 0$, пошто свакако није од интереса случај када је $x = 0$ решење једначине, добијамо да је $\cos\varphi = \pm 1$, те је заправо наведени полином дељив са $x - r$ или $x + r$.

За једначине (1) и (2) он говори да су једначине алгебарских кривих степена m , само представљене у поларним координатама и леву страну у једначини (1) означава са U , а у једначини (2) са T .

Гаус сада жели да покаже да систем једначина $U = 0$, $T = 0$ има решење, тј. да се ове криве секу. Он тврди да за довољно велико R постоји тачно $2m$ тачака пресека криве $U = 0$ и круга полупречника R , као и тачно $2m$ тачака пресека криве $T = 0$ и тог круга, и то тако да се тачке пресека једне и друге криве појављују једна између друге. Ове алгебарске криве имају по m грана и он то илуструје цртежом:



Слика 3: Гаусов први доказ

Парни бројеви означавају пресеке круга и грана криве $T = 0$ (обратите пажњу да је x -оса једна од грана те криве), а непарни се односе на криву $U = 0$. Зашто се све дешава баш тако? Гаус каже да ако грана неке алгебарске криве улази у неки домен, она одатле и излази. Он ово сматра за јасно и не доказује, даје само следећи коментар у облику фусноте.

Чини се да је доказано са довољном сигурношћу да алгебарска крива нити може да се прекине било где (као што се дешава, на пример, са кривом чија је једначина $y = 1/\ln x$) нити се може изгубити, да тако кажемо, у некој тачки после бесконачно много намотаја (као код логаритамске спирале). Колико ја знам, нико није истакао било какву сумњу у вези овога. Ипак, ако би неко то тражио, онда бих се подухватио задатка да дам доказ, који не подлеже било каквој сумњи, неком другом приликом...

Но, ово тврђење о реалним алгебарским кривама није нимало тривијално и данас многи сматрају да је Даламберов доказ, који има мана, лакше поправити но Гаусов. Заправо је тек 1920. године Александар Островски дао непобитан доказ свих Гаусових тврђњи у овој тези и то је објављену у научном часопису у Гетингену. Но, тај доказ нимало није лак. Занимљиво је навести да је једноставнији доказ тога што Гаус тврди, дат у часопису *American Mathematical Monthly* 2017. године.

Наставак доказа да постоји пресек ове две криве Гаус изводи овако. Претпоставимо да пресек не постоји. Тачка 0 је повезана са тачком $2m$ x -осом (видети цртеж, ту је $m = 4$). Тачка 1 се онда не може повезати са неком тачком са друге стране x -осе а да је не пресече. Стога, ако је тачка 1 повезана са неком непарном тачком n , онда је $n < 2m$. На исти начин, ако је 2 повезано са парном тачком n' мора бити $n' < n$. Приметимо да је разлика $n' - 2$ парна и да је мања од разлике $2m - 0$. Настављањем поступка долазимо до ситуације да је тачка h повезана са тачком $h+2$. Но, сада грана алгебарске криве која 'улази' у круг у тачки $h+1$ мора обавезно сећи грани која повезује h и $h+2$ што противречи претпоставци.

Гаусов други доказ је алгебарски, не укључује геометријска разматрања. Он је базиран на два резултата.

1. Сваки реални полином непарног степена има бар једну нулу.
2. Свака квадратна једначина са комплексним коефицијентима има два комплексна корена.

Гаус разматра реални полином степена m

$$Y = x^m - L'x^{m-1} + L''x^{m-2} - \dots + \dots \quad (3)$$

Он овај полином мења полиномом y чије су нуле неодређене a, b, c, \dots :

$$y = (x - a)(x - b)(x - c) \dots \quad (4)$$

Посматрајмо потом помоћни полином σ у новој промељивој u дефинисан као производ

$$\zeta = (u - (a+b)t + ab)(u - (a+c)t + ac) \dots \quad (5)$$

Видимо да је ово производ линеарних фактора који су добијени избором паре неодређених. Стога је $\deg \zeta = m' = \binom{m}{2} = \frac{1}{2}m(m-1)$. Даље, овај

полином је изражен помоћу u , t и симетричан је у неодређеним a, b, c, \dots . Но, елементарне симетричне функције од ових неодређених дају коефицијенте L', L'', \dots полинома Y (присетимо се Вијетових формулa; знаци коефицијената су тако бирани да су коефицијенти баш симетричне функције). Заменом добијамо помоћни полином Z степена m' . Гаус сада доказује да ако дискриминанта полинома Y није нула, онда ни дискриминанта од Z није 0 (дискриминанта неког полинома је једнака нули ако он има вишеструке корене). Потом бира за t реалну вредност тако да дискриминанта остаје различита од нуле и показује да, ако је корен од Z познат, пар корена оригиналног полинома се може добити (знатно колико су $a+b$ и ab , те онда решавањем квадратне једначине добијамо a и b). Главна ствар у овом доказу је да се итерирањем овог поступка добијају полиноми чији је степен све мање дељив са 2. Наиме, ако је $m = 2^\mu(2k+1)$, онда је $m' = 2^{\mu-1}(2k+1)(2^\mu(2k+1)-1) = 2^{\mu-1}(2k'+1)$. Тако најзад добијамо полином непарног степена који има реалну нулу. И онда идемо уназад те добијамо и нуле почетног полинома.

Трећи Гаусов доказ користи математичку анализу. Можемо да га гледамо и као доказ, који у својој основи користи Гринову формулу из Анализе 2, или резултате из Комплексне анализе. Свакако је то директан доказ. О њему ћемо заиста кратко. Поново се полази од полинома са реалним коефицијентима

$$X = x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \dots + Lx + M$$

и разматрају помоћне функције

$$t = r^m \cos m\varphi + Ar^{m-1} \cos(m-1)\varphi + Br^{m-2} \cos(m-2)\varphi + \dots + Lr \cos \varphi + M;$$

$$u = r^m \sin m\varphi + Ar^{m-1} \sin(m-1)\varphi + Br^{m-2} \sin(m-2)\varphi + \dots + Lr \sin \varphi.$$

Гаус наравно жељи да докаже да систем једначина $t = 0, u = 0$ има решење. Претпоставимо да то решење не постоји, тј. да је $t^2 + u^2 \neq 0$ за све вредности r и φ . Гаус посматра функцију

$$y = \frac{g}{r(t^2 + s^2)},$$

при чему је g полином по t, u , као и њиховим првим и другим парцијалним изводима по φ (с обзиром на природу ових функција, ти парцијални изводи су функције истог облика). Затим тражи интеграл ове функције по доволно великом диску са центром у координатном почетку.

$$\Omega = \int \int_{0 \leqslant \varphi \leqslant 2\pi, 0 \leqslant r \leqslant R} y dr d\varphi.$$

Заправо код Гауса φ узима вредности од 0° до 360° . Ми смо то ипак мало модернизовали Θ . Но, испоставља се да ако се интеграли прво

по φ добија се да је $\Omega = 0$, а ако се интеграли прво по r , па онда по φ , добија се да је $\Omega > 0$. Ова контрадикција показује да је $t^2 + s^2 = 0$ негде, а то је и тражено.

Галоа



Слика 4: Еварист Галоа

Еварист Галоа (1811–1832) био је син градоначелника једног малог града у околини Париза. Два пута (1828. и 1829) је покушао да се упише у École Polytechnique и после ових неуспелих покушаја уписао је École Normale. Треба рећи да је Политехничка школа била на знатно вишем нивоу од Нормалне, али је младог Галоа привлачила и због јаког студенцког политичког покрета у тој школи, а Галоа је републиканске идеје наследио од својих родитеља. Осим тога, Галоа је доживео породичну трагедију непосредно пре свог другог покушаја да упише Политехнику – отац му је извршио самоубиство због скандала изазваног његовим фалсификованим потписом на неким дописима.

Његов први објављени рад је чланак од 8 страна о верижним разломцима објављен у *Математичким аналима* Жергоња 1828. године (Жозеф Жергонј (1771–1859) био је француски математичар који је издавао овај утицајни часопис). Ту је он показао како се, ако се један корен алгебарске једначине ма ког степена изражава непосредно периодичним верижним разломком, онда се неки други корен изражава такође периодичним верижним разломком који се добија дељењем -1 истим верижним разломком, али написаним у обратном поретку.

У мају 1829, Галоа је приложио свој први рад о својим истраживањима о решавању алгебарских једначина, Академији наука Париза, а други, о једначинама простог степена осам дана касније, 1. јуна. Оба рада су послата Кошију који их је изгубио и они никада нису нађени.

У фебруару 1830. Галоа је Академији приложио још један рад на исту тематику да би био разматран за Велику награду Академије. Овај пут је рад добио стални секретар Академије Фурије, али је он умро пре него што је стигао да прегледа рад. Ни овај рукопис никада није нађен. Награду су поделили Јакоби и Абел (постхумно), док Галоаов рад није ни разматран.

Софи Жермен (1776–1831, француска математичарка која је имала значајне резултате посебно у теорији бројева) је писала о овоме:

... смрт господина Фуријеа је била превише за овог студента Галоу који, упркос својој дрскости, показује знаке паметне природе. Све ово је довело до тога да је он избачен са Нормалне школе. Сада је без новца... Кажу да ће потпуно полудети. Плашим се да је то тачно.

У априлу 1830. Галуа је објавио „ноту” (кратак рад) од две странице у *Билтену* (барона) Ферусака у којој су главни резултати рада који је приложио Академији били наведени без доказа. Прва и најзначајнија теорема која је наведена у овој ноти гласи:

Да би једначина простог степена била решива у радикалима потребно је и довољно да се сви остали корени могу рационално изразити преко нека два од њих.

Јасно је да ово показује да општа једначина реда 5, која има 5 корена који су независни један од другог, не може решити у радикалима.

Изузетно значајан је рад крајње једноставног наслова „О теорији бројева” објављен у *Билтену* Ферусака у јуну 1830. године, а у коме је Галоа одредио структуру коначних поља (која се данас називају и Галоаовим пољима). Прикажимо до којих је резултата дошао.

И Абел и Галоа су имали јасан појам „поља”. Поља која су и Абел и Галоа разматрали у проблему решивости алгебарске једначине су увек поља која садрже у себи поље рационалних бројева. Садашњим језиком говорећи, ради се о пољима карактеристике 0. Но, у овом раду он се бави пољима карактеристике p за прост број p . Њега заправо занимају величине које постају 0 после множења са p . Ево шта он пише.

Ако се договоримо да сматрамо за нулу све величине које при алгебарском рачунању јесу умношци од p и ако се покуша да се, при овој конвенцији, нађе решење једначине $Fx = 0$, које господин Гаус означава нотацијом $Fx \equiv 0$, обичај је да се разматрају само целобројна решења. Како сам ја, вођен својим

истраживањима, разматрао и несамерљива решења, добио сам неке резултате за које сматрам да су нови.

Дакле, Галуа јесте мотивисан разматрањем решавања конгруенција, али за разлику од Гауса који и за нелинеарне конгруенције, попут $x^2 \equiv a \pmod{p}$, допушта само целобројна решења, Галуа би желео да размотри и 'ирационална решења', тј. желео би да посматра расширења од \mathbb{Z}_p добијена додавањем нових елемената. Он претпоставља да је полином Fx нерастављив по модулу p . Пита се да ли може наћи нова решења увођењем нових 'символа' који се могу показати исто тако корисним као и увођење имагинарне единице i у анализу.

Галуа означава са i један од корена конгруенције $Fx \equiv 0$ степена v (то i наравно није из \mathbb{Z}) и формира p^v израза

$$a + a_1 i + a_2 i^2 + \cdots + a_{v-1} i^{v-1}. \quad (6)$$

где су a, a_1, \dots, a_{v-1} цели бројеви по модулу p . Ови елементи ће формирати поље, које данас називамо Галуаово поље и једна од ознака је и $GF(p^v)$.

Он даље показује да, ако се посматрају сви ненула елементи (и тако добије једна група у односу на множење) и овде, као у случају разматрања по модулу p постоје примитивни корени, тј. ова група је циклична (у данашњој терминологији). Дакле, сваки елемент Галоаовог поља је корен полинома $x^{p^v} - x$.

На крају свог рада, Галуа полази од ма ког расширења од $GF(p)$ у коме се горњи полином факторише на линеарне факторе. Посматрајући само потпоље генерисано коренима горњег полинома, он констатује да постоји „примитивни елемент“ и у том потпољу. Каже да је то јасно на основу једне Абелове теореме. Тада елемент је нула неког нерастављивог полинома степена v . Без обзира који полином да се узме, увек се долази до истог поља $GF(p^v)$. На пример, у случају $p = 1$ и $v = 3$ констатује да се за тај полином може узети $x^3 - 2$ који је нерастављив по модулу 7.

У јануару 1831. Академија је примила трећу, редиговану верзију, његовог централног рада под насловом „Мемоар о условима за решивост једначина радикалима“. Академија је замолила Поасона и Лакроа да напишу рецензију за овај рукопис. Поасон га је пажљиво прегледао и закључио да не може да га разуме. Ево и завршетка те рецензије.

Урадили смо све највише што смо могли да разумемо Галоаове доказе. Његово резоновање није доволно јасно, нити је доволно развијено да бисмо могли да дамо оцену његове тачности и чак нисмо у могућности да дамо идеју његовог резоновања у овој рецензији. Аутор тврди да је тврђење које је посебан циљ овог мемоара део опште теорије, која потенцијално има многе примене. Често се дешава да разни делови теорије, који појашњавају један

други, буду лакше схватљиви као целина, него изоловани. Стога, да би се формирала сигурна оцена треба причекати док аутор не објави своје дело као целину. Но, у садашњем облику, за део који је поднесен Академији не можемо дати позитивно мишљење.

Галоа није стигао да представи своју комплетну теорију у облику научног рада. Он је погинуо у двобоју 30. маја 1832. Како је до двобоја дошло, јесте једна од мистерија које окружују овог младог човека. На основу најновијих истраживања, а која свакако нису рекла последњу реч о овом питању, укратко то можемо овако појаснити.

Већ је речено да је Галуа био истакнут у својим револуционарним активностима усмереним против уставне монархије установљене 1830. године у Француској. Dana 9. маја 1831. године 200 републиканаца се скupilo да прослави ослобађање 19 артиљеријских официра Националне гарде који су крајем 1830. године ухапшени и оптужени за издају. Током ове вечере је Галоа, наводно, са бодежом у руци, претио краљу. Ухапшен је исте вечери, али је, изненађујуће, на суђењу 15. јуна ослобођен оптужбе. На Дан Бастиље 14. јула 1831. је поново ухапшен јер је носио забрањену униформу артиљеријског официра Националне гарде, а носио је и напуњену пушку, више пиштолја и нож. Ухапшен је и враћен у затвор у коме је претходно био. Током боравка у затвору, добио је обавештење да му је „Мемоар” одбијен. Покушао је самоубиство, али су га остали затвореници у томе спречили. У стању пијанства се жалио другима колико му недостаје отац. У марта 1832. дошло је до епидемије колере у овом затвору и затвореници су пребачени на друго место. Ту се, по свему судећи, заљубио у Ђерку лекара из тог краја. Пошто је био отпуштен из затвора 28. априла, разменио је нека писма са њом, али је јасно да његова осећања нису била узвраћена.

Све те невоље које су га снашле, укључујући и ту неузвраћену љубав, довеле су до тога да је решио да се жртвује за револуционарну ствар. За покретање оружаног устанка, била је потребна и нека жртва и Галоа је решио да он буде та жртва. У наредним данима је написао неколико писама у којима је навео да је изазван на двобој од стране монархиста (а није пропустио да спомене да ће погинути и због „озоглашене кокете”). Заправо се договорио са својим пријатељем да одглуме двобој у коме ће Галуа страдати. Скоро је сигурно да је идентитет његовог пријатеља Перше Дербенвил (а то име је и Александар Дима навео у својим мемоарима). Галоа је навео да не замере онима који ће га убити, јер имају добру намеру. На његовој сахрани се скupilo 3000 људи који су били спремни да нападну полицију и тиме започну побуну, но током сахране се сазнalo да је генерал Ламарк, који је такође био велики критичар тренутног режима (генерал је био познат по значајним војним успесима под Наполеоном, касније је био критичар и рестаурације Бурбона и касније уставне монархије) и онда

је закључено да би његова сахрана била боља прилика за побуну. До те побуне је и дошло у јуну 1832. године, али то није тема за нас.

У сваком случају, за нашу причу је значајно да је Галоа последњу ноћ пред двобој, дакле ноћ између 29. и 30. маја, провео састављајући подуже писмо свом пријатељу Огисту Шевалијеу у коме је објаснио основне идеје своје теорије. Ово писмо је објављено у Енциклопедијској ревији у септембру 1832. године. Галуа га завршава молбом пријатељу да јавно затражи мишљење од Јакобија и Гауса, не о тачности, него о значају теорема до којих је дошао.

После тога, наћи ће се, надам се, људи којима ће бити у интересу да распетљају сав овај галиматијас.

Нажалост, ни Јакоби ни Гаус се никада нису изјаснили овим поводом и шири круг математичара је тек 1846. године када је Лиувил у свом часопису објавио Галоаове математичке радове, сазнао за ове његове идеје.

Прикажимо сада, укратко, садржину Галоаовог „Мемоара”. Галоа почиње од једначине $f(x) = 0$. Коефицијенти овог полинома су познате величине, на пример рационални бројеви, или чак и само слова. Све рационалне функције ових коефицијената он назива рационалним. Могу се додавати и нове величине, на пример m -ти корени из постојећих. У савременој терминологији, Галоа почиње од неког основног поља и онда додаје нове елементе, те тако формира раширења поља. Он овде користи, али не сасвим конзистентно, термине пермутација и супституција. Посматра групе супституција које имају следеће својство: ако S и T припадају некој таквој групи, онда је у њој и ST . Обратите пажњу да он захтева само да је композиција две супституције у истој групи. Но, супституције су бијекције, а групе које разматрају коначне и ово му је доволно да може да закључи да је и идентична супституција ту, као и да је инверз сваке супституције у тој групи (размислите зашто).

Галоаова прва лема каже да ако неки полином f има заједнички корен са неким нерастављивим полиномом g , онда је f деливо са g . Овај се резултат такође налази у Абеловом раду из 1829. Ова лема нам говори да је поље $K(V)$ које се добија додавањем неког корена нерастављивог полинома пољу коефицијената K потпуно одређено чим се зна базно поље K и нерастављив полином g – ми сада знамо да је то поље изоморфно количничком прстену $K[X]/\langle g \rangle$.

Он затим показује да ако једначина $g(x) = 0$ нема вишеструке корене и ако су корени a, b, c, \dots увек се може наћи функција ових корена V тако да су све вредности које се добијају свим пермутацијама a, b, c, \dots различите. Заправо Галуа каже да се за то може узети

$$V = Aa + Bb + Cc + \dots$$

за неке целе бројеве A, B, C, \dots . Одавде он добија да се тада сви корени a, b, c, \dots добијају као рационалне функције од V . Другим речима, $K(a, b, c, \dots) = K(V)$. У овом доказу он неке међукораке и не доказује, те је Поасон исправно написао да је доказ овога некомплетан, али да је резултат тачан на основу једног Лагранжовог резултата. Тај елемент V је корен неког нерастављивог полинома. Ако су сви корени тог полинома $V, V', V'', \dots, V^{(n-1)}$ онда следећа лема констатује да ако је $a = \varphi(V)$ корен почетне једначине, онда је $\varphi(V')$ такође корен те једначине.

Потом доказује главни резултат.

Став 1. Постоји група пермутација слова a, b, c, \dots тако да

1° Свака функција корена која је инваријантна на супституције у групи јесте рационално одредива.

2° Обратно, свака функција корена која је рационално одредива је инваријантна у односу на групу.

Видимо овде неконзистентност терминологије у вези пермутација и супституција, но јасно је о чему се ради. Он потом истражује како се мења група једначине ако се основно поље проширије додавањем једног, или чак свих корена неке помоћне једначине (задате нерастављивим полиномом). Јасно је да ће нова група бити нека подгрупа H почетне групе G . Он пажљивије говори о овоме у писму Шевалијеу.

Пише да се, уколико је H права подгрупа од G група G може раставити у облику

$$G = H + HS + HS' + \dots \quad (7)$$

или у облику

$$G = H + TH + T'H + \dots \quad (8)$$

Овде се наравно ради, у савременој терминологији, о разбијање групе на леве, односно десне косете по некој подгрупи. Галоа каже да се ове две декомпозиције не морају поклапати, а ако се поклапају, он каже да се ради о „правој” декомпозицији. У савременој терминологији наравно имамо тада у питању нормалну подгрупу. Он посебно наводи да је то случај када се додају сви корени помоћне једначине. Он доказ не наводи, само каже да се може наћи.

Сада он долази до основног питања: када се једначина може решити помоћу радикала. Наравно, доволно је посматрати радикале (корене) простог степена. Галоа овде претпоставља да се додају одговарајући корени из јединице на самом почетку, али на основу радова Гауса, то није неопходно претпоставити — p -ти корени из јединице могу се изразити преко радикала степена мањег од p .

Претпоставимо да додавање радикала r , који је корен једначине

$$x^p - s = 0 \quad (9)$$

доводи до редукције Галоаове групе. Као су сви p -ти корени из јединице по Галои већ у основном пољу, то смо заправо додали све корене једначине (9) (остали су облика αr , где је α p -ти корен из 1). Дакле, ради се о „правој“ декомпозицији (подгрупа је нормална). Галоа тврди, али не доказује, да је број чланова у декомпозицији (7) (дакле, индекс подгрупе H у групи G) једнак p . Важи и обратно – ако је H подгрупа индекса p онда се Галоаова група G може редуковати на H додавањем радикала степена p .

Дакле, једначина $f(x) = 0$ је решива у радикалима ако и само ако постоји низ подгрупа

$$G \supset H_1 \supset H_2 \supset \cdots \supset H_m = \{e\}$$

тако је да H_k нормална подгрупа од H_{k-1} чији је индекс прост број. Наравно, те групе данас називамо решивим групама.

Галоа потом претпоставља да је једначина $f(x) = 0$ задата нерасстављивим полином чији је степен прост број p . Доказује да се ова једначина може решити у радикалима ако и само ако свака супституција из G трансформише корен x_k у корен $x_{k'}$ линеарном трансформацијом k по модулу p :

$$k' \equiv ak + b \pmod{p}.$$

Галоаова група опште једначине петог степена нема овај облик, те стога ова једначина није решива у радикалима.

Почеци теорије скупова

Сада ћемо покушати да прикажемо како се развио савремени поглед на бесконачне скупове и како су скупови постали основа на којој градимо савремену математику. Но, у том приказу видећемо и како се развијао појам функције.

Наше излагање започињемо кратким освртом на рад Бернарда Болцана (1781–1848, чешки филозоф и математичар италијанског порекла).



Слика 5: Бернард Болцано

Сигурно најпознатије дело овог математичара је његов рад из 1817. године у којем је доказао теорему да свака непрекидна функција узима све међувредности и која је сигурно свим студентима позната из курса математичке анализе (сличан доказ је касније дао и Коши у свом *Курсу анализе*, те је зато та теорема и позната као Болцано-Кошијева теорема).

Но, ми се нећемо задржавати на овом раду, но на његовој постхумно објављеној расправи *Парадокси бесконачног* (1851). До овог рада, чак и велики математичари попут Даламбера и Гауса, су избегавали да прихвате стварно постојање бесконачног, но су о појму бесконачности писали као о *начину изражавања*, у контексту променљивих величина које могу узимати произвољно велике вредности и слично. Болцано у овој својој расправи истиче да бесконачни објекти заиста постоје. На пример, он овде наводи да је реална права бесконачна, а није променљива. Такође наводи и следећи пример (скоро идентичан пример је касније навео и Ледекинд (Јулијус Виљем Рихард Ледекинд, 1831–1916, немачки математичар) у својој дискусији о бесконачним скуповима, а о којој ће касније бити више речи): скуп свих истине

је бесконачан. Наиме, узмимо било које истинито тврђење A . Онда можемо формирати ново тврђење B , које НИЈЕ идентично старом: „ A је истинито”. Дакле, на тај начин добијамо ново истинито тврђење B и потом C итд. Он указује да тако добијамо бесконачно много тврђења, а и истиче сличност формирања ових тврђења формирању скупа свих (природних) бројева.

Најзанимљивији део за ову нашу причу је вероватно следећи пример, који Болцано наводи. Он разматра два скупа: све реалне бројеве (за њега, све *величине*) између 0 и 5 и све реалне бројеве између 0 и 12 и истиче да постоји бијекција (овде користимо савремену терминологију, Болцано није то тако исказао) између ова два скупа задата једначином $5y = 12x$. Но, он нажалост пропушта могућност да препозна појам кардиналности бесконачних скупова, него истиче да ипак не можемо те скупове сматрати једнаким у односу на бројност својих чланова, пошто, тако каже Болцано, елементима 3 и 4 одговарају елементи $7\frac{1}{5}$ и $9\frac{3}{5}$ и док су елементи 3 и 4 на растојању 1, дотле су елементи који њима одговарају на растојању $2\frac{2}{5}$. И стога те скупове он не сматра истобројним. Очигледно је да код њега још увек превелики значај имају метричка својства. Из других примера које наводи види се да и Еуклидов „цело је веће од свог дела” има велики утицај на њега, чак и у разматрањима која се тичу бесконачних скупова (и суме). Занимљиво је да он чак понегде истиче да скупови могу имати исте елементе, а да су ипак различити! Наводи као пример крчаг и разбијени крчаг. Очигледно је да апстрактан појам скупа није још присутан код њега.

На крају треба још истаћи да Болцанови радови нису били довољно познати у своје време, па чак ни доста касније те да стога нису имали значајан утицај на развој математике тога времена.

Први велики математичар (Болцано је као математичар имао одређени значај, али сигурно се не би могло рећи да је био велики математичар), који је имао значајан утицај на развој теорије скупова био је свакако Риман (Георг Фридрих Бернхард Риман (1826–1866), немачки математичар).



Слика 6: Георг Риман

Риманов живот је био нажалост кратак, али изузетно плодотворан са математичке тачке гледишта. Он је започео студије на универзитету у Гетингену 1846. године да би године од 1847. до 1849. провео у Берлину где је имао прилику да учи од Јакобија и Дирихлеа. По повратку у Гетинген започела је једна од сигурно најуспешнијих деценија у историји математике. Риман је одбранио докторат 1851. године из области комплексне анализе и у том докторату је увео појам Риманове површи. Године 1853, предао је своју тезу за хабилитацију на тему Фуријеових (Жан Баптист Жозеф Фурије (1768–1830), француски математичар) радова, у оквиру које је прецизирао појам интеграла. Наредне године је одржао своју лекцију за хабилитацију о нееуклидској геометрији у којој је увео појам многострукости и са којом се може рећи да започиње модерни развој диференцијалне геометрије. Значајан рад о Абеловим функцијама објавио је 1857. године, а рад о зета функцији 1859. године. Читаоцу је свакако јасно да би за приказ свих ових радова и њиховог значаја, била сигурно потребна не једна, но више књига, али ми ћемо се у нашем историјском осврту задржати само на најважнијим елементима који се тичу теорије скупова.

Први Риманов утицај на развој теорије скупова је садржан у његовој лекцији за хабилитацију, коју је имао обавезу да одржи да би добио одобрење да предаје у Гетингену. У ту сврху он је понудио три теме и Гаус је, што је било неубичајено, одабрао да Риман одржи лекцију на трећу тему. И Римана је то изненадило (у писму свом брату је писао да је припремио прве две теме добро и да се надао да ће Гаус изабрати неку од њих, али да сада мора да припреми и предавање за ту трећу тему). Ово предавање је одржано 10. јуна 1854. године и наслов је био: *O хипотезама које леже у основи геометрије*. Сам

Гаус, који је предложио тему, био је веома импресиониран Римановим излагањем.

Како је предавање било замишљено за ширу публику, у њему није било техничких резултата, као што би се популарно рекло „није било много формула”, но било је богато дубоким и новим идејама. У њему је Риман увео појам **многострукости**, на немачком *Mannigfaltigkeit*, као *n*-тоструко проширене величине. Ту је практично дата савремена дефиниција многострукости — (тополошки) простор, који је локално еуклидски простор од *n* димензија. Дискутовано је о појму растојања, дужине кривих и уопште о рачуну у таквим просторима. Треба истаћи да је Риман ту успутно навео и могућност разматрања, тј. постојања и бесконачно димензионалних многострукости (многострукости чије су тачке функције, за које је потребно задавање бесконачно много величина, другим речима вредности функција). Но, за нашу причу је значајно то што Риман разликује непрекидне многострукости и дискретне многоstrukости. Он каже да су индивидуалне специјализације непрекидних многострукости тачке, а дискретних, елементи многострукости. Заправо, може се рећи да је он овим својим радом желео да учини и више од онога што је садржано у самом наслову. Док би се за непрекидне многострукости могло рећи да представљају истинску расправу о геометријском простору, дотле дискретне многострукости заправо представљају први почетак заснивања свих појмова математике на појму скупа. Наиме, дискретна многострукост није ништа друго него скуп. Заправо Кантор (Георг Фердинанд Лудвиг Филип Кантор, 1845–1918, немачки математичар), под очигледним утицајем Риманових идеја, у својим првим радовима посвећеним скуповима *није* користио за скупове термин *Menge*, но Риманов термин *Mannigfaltigkeit*. Ово Риманово предавање није било одмах доступно широј публици. Заправо, оно је објављено тек 1868. године, две године после Риманове смрти и имало је изванредан утицај на развој математичара те и будућих генерација.

Док се у овом Римановом предавању о геометрији налази клица каснијег заснивања математике на појму скупа и оно као такво представља методолошко-филозофску основу за почетак развоја теорије скупова, дотле његова хабилитациони теза, која је посвећена разматрању Фуријеових редова, представља конкретну основу на којој су започела истраживања која су довела до развоја апстрактне теорије скупова, основних тополошких појмова, као и теорије мере. Стога ћемо посветити пажњу и тој тези.

Да бисмо боље схватили проблеме који су се истраживали, морамо да се вратимо мало уназад у времену, до Ојлера.

У свом *Уводу у анализу бесконачности* из 1748. године, он је дефинисао функцију променљиве величине као „аналитички израз”, који је на произвољан начин направљен од те променљиве и разних константи.

Дакле, за функцију је неопходно да има запис у облику формуле. Но, он је у свом ранијем раду из 1734. у области парцијалних диференцијалних једначина допуштао и могућност да функција буде „прекидна”, тј. да нема јединствен аналитички запис у целој области, него да *криве* које представљају график функције буду састављене од више делова са потенцијално различитим аналитичким записом. То је истакао и у расправи са Даламбером (Жан ле Рон Даламбер (1717–1783), француски математичар) који је 1747. показао да једначина струне која осцилује има решење $F(x, t) = \frac{1}{2}(f(x+t) + f(x-t))$. Даламбер је истицао да f мора бити „непрекидна“, тј. да има јединствен аналитички запис, док је Ојлер сматрао да може да буде и прекидна у горе наведеном смислу те речи. У ту дискусију се укључио и Данијел Бернули (1700–1782, швајцарски математичар), који је на основу физичког разматрања о струни која осцилује, навео да функција f мора бити представљива у облику реда

$$f(x) = a_1 \sin(\pi x/L) + a_2 \sin(2\pi x/L) + \dots,$$

где је L дужина струне. Са математичке тачке гледишта, Бернулијево тврђење се своди на то да се свака функција може представити тригонометријским редом. То тврђење је већина водећих математичара одбацила.

Но, Фурије, најпре у свом раду о провођењу топлоте из 1807, који није објављен, а потом у свом значајном делу *Аналитичка теорија топлоте* из 1822, враћа се на ту идеју. Заправо, он тврди да се свака ограничена функција f на $(-\pi, \pi)$ може представити у облику

$$f(x) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)), \quad (*)$$

где су коефицијенти задати са

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx.$$

Наравно, ово су сада свима добро познате формуле из теорије Фуријеових редова.

Фурије говори о произвољној функцији, али се из његовог излагања види да ипак размишља на начин својих претходника. На пример, њему је функција задата са e^{-x} за ненегативне x , а са e^x за негативне x (другим речима, функција $e^{-|x|}$) „прекидна“ пошто је задата помоћу два аналитичка израза.

Он је заправо дао два доказа свог тврђења о развоју произвољне функције у тригонометријски ред. У првом доказу је претпоставио да се функција може развити у степени ред и затим решавајући систем од бесконачно много једначина са бесконачно много непознатих, дошао

до траженог развоја. У другом доказу он разматра „произвољну“ функцију (претпоставља се да је ограничена) и полази од једначине (*). Множењем те једначине са $\cos(nx)$ и $\sin(nx)$ и интеграцијом (при чему интеграл пролази кроз суму) он добија коефицијенте у наведеном облику и тиме тврди да је функција f заиста представљена тим тригонометријским редом. Много се примедби може навести у вези таквог „доказа“. Пре свега, није јасно зашто се ред може интегралити члан по члан, зашто чак и када се интеграли члан по члан, наведени интеграли постоје и напокон, зашто тако одређени коефицијенти заиста дају тригонометријски ред чија је сума једнака датој функцији. Дакле, много је примедби, а Фурије је покушао да оправда постојање интеграла о којима је реч. Наиме, он је објаснио да је функција $f(x)\sin x$ која се добија множењем произвољне функције функцијом синус сличног понашања као и синусна функција, она само представља синус који је „увећан“ за одговарајући фактор (као да имамо осцилацију тако да величина амплитуде варира у свакој тачки) и да онда интеграл јесте задат површином. Но, није дао објашњење зашто та површина постоји.

Дакле, модерни концепт непрекидне функције се сигурно не може наћи код Фуријеа и заправо се први пут појављује код Кошија. У свом *Курсу анализе*, он уводи појам непрекидности на следећи начин. функција f , која је дефинисана и ограничена на одсечку $[a, b]$ је непрекидна унутар тих граница уколико за x из тог одсечка „нумериичка вредност разлике $f(x + \alpha) - f(x)$ бесконачно опада како то чини α “. Дакле, Коши дефинише не појам непрекидности у тачки, него непрекидности на одсечку. Заправо се појам непрекидности и појам равномерне непрекидности код њега не разликују. Године 1823, Коши дефинише одређени интеграл непрекидне функције помоћу интегралних сума. Он наиме разматра поделу одсечка $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$ и суму $S = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1})f(x_i)$. Уз коришћење равномерне непрекидности функције f (као што је горе напоменуто), он показује да су за поделе чија је норма довољно мала (норма поделе је наравно максимална дужина интервала поделе) и одговарајуће суме произвољно близу и закључује да постоји јединствени лимес и тај лимес је заправо одређени интеграл. Он у даљем, за непрекидну функцију f , разматра и функцију $F(x) = \int_0^x f$ и количник $\frac{F(x+h) - F(x)}{h}$ и показује да је F једна примитивна функција за f , тј. $F' = f$, као и да се свака друга примитивна функција за f од F разликује за константу.

Као што видимо, резултати које је Коши добио су сасвим савремени и у модерном духу. Но, и поред тога, Коши ипак није разматрао опште функције, тј. за Кошија функција ипак није била произвољно придрживање, но се и код њега у основи крила концепција да функција мора бити задата аналитичким изразом. То се најбоље може видети у чињеници да је Коши у доказима који се тичу конвергенције Фуријеових редова, у функцији $f(x)$ реалну променљиву x замењивао ком-

плексном променљивом $z = x + iy$, што заиста нема много смисла, сем уколико се подразумева да је f ипак задата неким аналитичким записом.

И поред дефиниције појма непрекидности, Коши није у пуној мери разматрао могућности постојања произвољних прекидних функција. „Најнеправилније“ функције у том смислу које је он разматрао су зајправо биле функције облика (наравно у модерној нотацији)

$$\chi_{I_1} g_1 + \cdots + \chi_{I_n} g_n,$$

где су са χ_{I_j} означене карактеристичне функције одсечака I_j , а g_j су непрекидне функције у његовом смислу. Дакле, прекидне функције које је Коши разматрао су биле искључиво оне које су имале највише коначно много тачака прекида. Први математичар који је озбиљно разматрао функције са бесконачно много тачака прекида био је Дирихле (Јохан Петер Густав Лежен Дирихле, 1805–1859, немачки математичар).



Слика 7: Лежен Дирихле

Дирихле је лично познавао Фуријеа, пошто је од 1822. до 1825. године боравио у Паризу. Он је 1829. године дао први строг доказ о конвергенцији Фуријевог реда дате функције f (наравно под одређеним условима). Наиме, он је разматрао парцијалну суму Фуријевог реда $S_n(x) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx))$ и приказао је ту суму у облику

$$S_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \frac{\sin \frac{(2n+1)(t-x)}{2}}{\sin \frac{t-x}{2}} dt,$$

коју су сигурно видели сви студенти на курсу анализе у којем се изучавају Фуријеви редови. Саму формулу наравно није тешко извe-

сти (присетимо се дефиниције коефицијената Фуријевог реда — одатле се добија интеграл). Дирихле је претпоставио да функција има или највећу или најмању вредност и да није непрекидна у највише коначно много тачака. Заправо тај услов му је требао да би се доказала егзистенција интеграла помоћу којих се одређују Фуријеови коефицијенти. Доказао је да парцијална сума конвергира ка $\frac{1}{2}(f(x-0) + f(x+0))$ за $x \in (-\pi, \pi)$, а ка $\frac{1}{2}(f(-\pi+0) + f(\pi-0))$ за $x = \pm\pi$. У доказу је ипак користио и претпоставку да је функција f монотона у довољно малом интервалу сваке тачке $x \in [-\pi, \pi]$.

Сматрао је да се случај функција које имају бесконачно много екстремних вредности, или бесконачно много тачака прекида, могу свести на случај који је разматрао. Заправо је сматрао да је једини услов да функција има интеграл. Као довољан услов за постојање интеграла, он је навео (користимо модерну терминологију) да функција мора бити таква да је скуп D , тачака прекида те функције, никада густ (подсетимо читаоца да је никада густ скуп онај скуп чије затворење не садржи ниједан интервал). Дирихле то тврђење није доказао и навео је да ће доказ бити презентиран у неком наредном раду, али... Тада је доказ никада није објавио.

Године 1864, у својој докторској дисертацији, Липшиц (Рудолф Ото Сигисмунд Липшиц, 1832–1903, немачки математичар) је покушао да



Слика 8: Рудолф Липшиц

прошири Дирихлеове резултате о конвергенцији Фуријеових редова. Интересантно је да је упркос чињеници да је његова теза рађена чак 10 година после Риманових основних резултата о којима ћемо ускоро говорити, ти резултати нису утицали на Липшицов рад и по свему судећи, он их и није био свестан. Као што смо већ написали, многи Риманови главни резултати су постали оштећени познати тек после његове смрти. Липшиц је пажљиво анализирао Дирихлеов доказ и разматрао

је могућности под којима Дирихлеов доказ „не би прошао” за дату функцију. Установио је да проблем настаје у случају ограничено и део-по-део монотоне функције (као што смо већ навели, те претпоставке јесу стајале у основи Дирихлеовог доказа), која има бесконачно много тачака прекида између $-\pi$ и π . Заправо, закључио је да би Дирихлеов доказ и прошао под условом да та функција има интеграл (дакле уколико се појам интеграла може проширити и на ту класу функција). Закључио је да уколико функција задовољава услов који је Дирихле навео (да је скуп тачака прекида D никада густ), то може бити изведено. Грешка коју је направио била је у томе што је сматрао да се тада може добити да је скуп D' , тачака нагомилавања скупа D , коначан. Проблем је заправо био и у томе што у то време није било занимљивих, другим речима нетривијалних, примера скупова који су никада гости и онда није било неочекивано да се дође до таквог закључка.

Но, Липшиц је ипак у својој тези дошао и до значајних резултата. Наиме, он се потрудио да замени Дирихлеов услов о монотоности неким другим условом и успео је да га замени другом претпоставком из које је успео да докаже Дирихлеов резултат. Услов који је дао данас је добро познат свим математичарима као Липшицов услов: $|f(x+h) - f(x)| \leq C|h|^\alpha$ за позитивне бројеве C и α .

Пре него што најзад пређемо на Риманов допринос у овој области, а који је био и основа за почетак Канторовог истраживања, а како ћемо видети и почетак озбиљног разматрања бесконачних скупова, наведимо ипак две значајне последице Дирихлеовог рада у овој области. Са његовим радом је први пут почела да се разматра разлика између појма непрекидних и појма интеграбилних функција. Такође је Дирихле био први значајни математичар који је заиста разматрао општи појам функције реалне променљиве, као пријруживање $x \mapsto f(x)$ независно од пртежа и формула. Уосталом добро нам је позната Дирихлеова функција која је на један начин задата на рационалним, а на други начин на ирационалним бројевима и коју је свакако немогуће напретати, а и задати формулом на начин како је то рађено до тада (поделом датог одсечка на мање одсечке и задавањем формулама на тим деловима). Дирихле је увео ту функцију као пример функције за коју појам интеграла нема смисла. Тек је са појавом Лебеговог (Анри Леон Лебег, 1875–1941, француски математичар) појма интеграла показано да то није тако, али то није већ није део наше приче.