

# Matrice

October 3, 2019

# Matrice

Matrica je pravougaona tablica brojeva sa  $m$  vrsta i  $n$  kolona:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

- Ako je  $m = n$  matrica je kvadratna.
- Dimenzija matrice  $m \times n$  predstavlja (broj vrsta)  $\times$  (broj kolona).
- Dve matrice  $A = [a_{ij}]$  i  $B = [b_{ij}]$  su jednake ako su istih dimenzija  $m \times n$  i ako je  $a_{ij} = b_{ij}$ ,  $1 \leq i \leq m$ ,  $1 \leq j \leq n$ .

## Definicija

*Neka su  $A = [a_{ij}]$  i  $B = [b_{ij}]$  matrice dimenzija  $m \times n$ . Njihov zbir je matrica dimenzije  $m \times n$ :  $A + B = [a_{ij} + b_{ij}]$ ,  $1 \leq i \leq m$ ,  $1 \leq j \leq n$ .*

Zbir dve matrice različitih dimenzija nije definisan.

## Definicija

*Neka je  $A = [a_{ij}]$  matrica dimenzije  $m \times n$  i  $\alpha$  skalar. Proizvod matrice  $A$  i skalara  $\alpha$  je matrica dimenzije  $m \times n$ :  $\alpha A = [\alpha a_{ij}]$ .*

## Teorema

*Neka su  $A, B$  i  $C$  matrice dimenzije  $m \times n$  i  $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$  skalari. Tada važi:*

- 1  $A + B = B + A$
- 2  $A + (B + C) = (A + B) + C$
- 3  $(\alpha\beta)A = \alpha(\beta A)$
- 4  $1A = A$
- 5  $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$
- 6  $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$

Dokaz: za domaći.

## Definicija

Neka je  $A = [a_{ij}]$  matrica dimenzije  $m \times n$  i matrica  $B = [b_{ij}]$  dimenzije  $n \times p$ . Proizvod dve matrice  $A$  i  $B$  je matrica dimenzije  $m \times p$ :

$$AB = [c_{ij}], c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}, \quad 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq p.$$

## Teorema

Neka su  $A, B$  i  $C$  matrice dimenzija takvih da su odgovarajuća množenja definisana i neka je  $\alpha \in \mathbb{C}$  skalar. Tada važi:

- 1  $A(BC) = (AB)C$
- 2  $A(B + C) = AB + AC$   
 $(A + B)C = AC + BC$
- 3  $\alpha(AB) = (\alpha A)B = A(\alpha B)$

Dokaz: za domaći.

- Ako postoji proizvod  $AB$  to ne znači da postoji i proizvod  $BA$ .
- Ako su  $A$  i  $B$  kvadratne, onda postoji i  $AB$  i  $BA$ . Međutim, množenje matrica u opštem slučaju nije komutativno tj.  $AB \neq BA$ .
- $AC = BC \not\Rightarrow A = B$ .
- Neutralni element za sabiranje je nula matrica (matrica istih dimenzija kao matrica sa kojom se sabira i kojoj su svi elementi nule).
- Neutralni element za množenje je jedinična matrica (na dijagonali

su jedinice, ostalo su sve nule):  $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$ .

- Ako je matrica  $A$  dimenzije  $m \times n$  onda je neutral za množenje sa desne strane jedinična matrica dimenzije  $n \times n$ , dok za množenje sa leve strane je jedinična matrica dimenzije  $m \times m$  tj.

$$A_{m \times n} \cdot I_{n \times n} = A_{m \times n} \text{ i } I_{m \times m} \cdot A_{m \times n} = A_{m \times n}.$$

## Definicija

**Transponovana matrica** matrice  $A$  dimenzije  $m \times n$  je matrica  $A^T$  dimenzije  $n \times m$  koja se od matrice  $A$  dobija tako što vrste matrice  $A$  zamene mesta sa odgovarajućim kolonama:

$$A^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

## Teorema

*Neka su  $A$  i  $B$  matrice dimenzija takvih da su operacije množenja definisane i neka je  $\alpha \in \mathbb{C}$  skalar. Tada važi:*

$$1 \quad (A^T)^T = A$$

$$2 \quad (A + B)^T = A^T + B^T$$

$$3 \quad (\alpha A)^T = \alpha A^T$$

$$4 \quad (AB)^T = B^T A^T$$



# Determinanta

Determinanta kvadratne matrice reda  $n$  definiše se preko determinanti matrica reda  $n - 1$ .

$$\text{Oznake: } \det(A), \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

Determinanta je broj.

## Određivanje determinante matrice

$$n = 1 : A = [a_{11}] \Rightarrow \det(A) = a_{11}.$$

$$n = 2 : A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

$n = 3$  : Sarusovo pravilo

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

$n > 3$  : po definiciji.

## Definicija

Determinanta koja se nalazi u preseku  $r$  proizvoljnih vrsta i  $r$  proizvoljnih kolona matrice  $A$  je **minor reda  $r$**  matrice  $A$ .

## Definicija

Ako je  $A$  kvadratna matrica, **minor  $M_{ij}$  elementa  $a_{ij}$**  je determinanta matrice koja se dobija nakon izbacivanja  $i$ -te vrste i  $j$ -te kolone matrice  $A$ .

## Definicija

**Kofaktor  $C_{ij}$**  je  $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ .

Napomena: Minori i kofaktori se mogu razlikovati samo u znaku.

## Definicija

Ako je  $A$  matrica reda  $n \geq 2$ , njena determinanta se računa preko:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{1j} C_{1j} = a_{11} C_{11} + a_{12} C_{12} + \dots + a_{1n} C_{1n}$$

## Teorema

Laplasov razvoj determinante po  $i$ -toj vrsti:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} C_{ij} = a_{i1} C_{i1} + a_{i2} C_{i2} + \dots + a_{in} C_{in}.$$

Laplasov razvoj determinante po  $j$ -toj koloni:

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{ij} C_{ij} = a_{1j} C_{1j} + a_{2j} C_{2j} + \dots + a_{nj} C_{nj}.$$

## Svojstva determinanti

- 1) Determinanta je aditivna po kolonama i vrstama.
- 2) Ako se svi elementi jedne vrste/kolone matrice  $A$  pomnože skalarom  $\lambda$  onda je determinanta tako dobijene matrice jednaka  $\lambda \det(A)$ .
- 3) Determinanta ne menja vrednost ako se jednoj vrsti/koloni doda neka druga vrsta/kolona pomnožena proizvoljnim brojem.
- 4)  $\det(AB) = \det(A) \det(B)$ .
- 5) Ako dve vrste/kolone matrice  $A$  zamene mesta determinanta tako dobijene matrice menja znak.
- 6)  $\det(A^T) = \det(A)$ .
- 7)  $\det(A) = 0$  ako je ispunjeno nešto od sledećeg:
  - cela vrsta ili kolona matrice  $A$  sadrži samo nule.
  - dve vrste/kolone matrice  $A$  su iste.
  - vrste/kolone matrice  $A$  su linearno zavisne.

# Inverzna matrica

## Definicija

Kvadratna matrica  $A$  reda  $n$  je **invertibilna** ako postoji kvadratna matrica  $B$  reda  $n$  takva da je

$$AB = BA = I.$$

Ukoliko takva matrica  $B$  postoji, nazivamo je **inverzom** matrice  $A$  i označavamo sa  $A^{-1}$  (tj.  $AA^{-1} = A^{-1}A = I$ .)

## Definicija

Matrica  $A$  je **regularna** ako je  $\det(A) \neq 0$ .

Matrica  $A$  je **singularna** ako je  $\det(A) = 0$ .

## Teorema

*Matrica  $A$  je invertibilna akko  $\det(A) \neq 0$ .*

Dokaz na času.

Napomena: samo regularne matrice imaju inverz.

## Teorema

*Ako je  $A$  invertibilna, onda je njen inverz jedinstven.*

Dokaz na času.

## Teorema

*Ako je  $A$  invertibilna, onda je  $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$ .*

Dokaz na času.

## Definicija

**Adjungovana matrica** matrice  $A$  reda  $n$  je matrica

$$\text{Adj}(A) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{bmatrix} C_{11} & \dots & C_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{1n} & \dots & C_{nn} \end{bmatrix}$$

gde su  $C_{ij}$  kofaktori.

## Teorema

Ako je  $A$  regularna kvadratna matrica, onda je

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{Adj}(A).$$



## Svojstva inverznih matrica

$$1) (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

$$2) (A^{-1})^{-1} = A$$

$$3) (A^{-1})^k = \underbrace{A^{-1} \cdot \dots \cdot A^{-1}}_{k \text{ puta}} = (A^k)^{-1}, k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}.$$

$$4) (cA)^{-1} = \frac{1}{c}A^{-1}, c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

$$5) (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

6) Ako je  $C$  invertibilna onda važi:

$$a) AC = BC \Rightarrow A = B$$

$$b) CA = CB \Rightarrow A = B$$

Dokazi na času.

# Rang matrice

## Definicija

*Rang matrice je maksimalni red regularnih minora matrice.*

## Teorema

*Rang matrice jednak je maksimalnom broju linearno nezavisnih vrsta te matrice odnosno maksimalnom broju linearno nezavisnih kolona te matrice.*

Kanonski oblik matrice je

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & & \\ & & 1 & \\ \vdots & & 0 & \vdots \\ & & & \ddots & \\ 0 & \dots & & & 0 \end{bmatrix}.$$

Rang je jednak broju jedinica na dijagonali.

## Definicija

*Dve matrice su **ekvivalentne** ako se iz jedne može dobiti druga nizom elementarnih transformacija. Ekvivalentne matrice imaju isti rang.*

**Elementarne transformacije** koje ne menjaju rang matrice:

- Množenje neke vrste/kolone brojem različitim od 0.
- Dodavanje nekoj vrsti/koloni neku drugu vrstu/kolonu pomnoženu nekim brojem.
- Zamena dve vrste/kolone.