

ЈЕДНАЧИНЕ МАТЕМАТИЧКЕ ФИЗИКЕ - март 2003

1. Решити Кошијев проблем у I квадранту

$$\begin{cases} x^2 u_{xx} - y^2 u_{yy} - 2yu_y = 0 \\ u(1, y) = y \\ u_x(1, y) = y \end{cases}$$

2. Решити Кошијев проблем

$$\begin{cases} 4u_t = u_{xx} \\ u(x, 0) = e^{-x^2} \sin x \end{cases}$$

3. Решити мешовити проблем

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} + 4u_x + e^{-2x} \cos^2 \pi x, & 0 < x < 1, \quad t > 0 \\ u(0, t) = 0 \\ u(1, t) = 0 \\ u(x, 0) = 0 \end{cases}$$

ЈЕДНАЧИНЕ МАТЕМАТИЧКЕ ФИЗИКЕ - март 2003

1. Решити Кошијев проблем у I квадранту

$$\begin{cases} x^2 u_{xx} - y^2 u_{yy} - 2yu_y = 0 \\ u(1, y) = y \\ u_x(1, y) = y \end{cases}$$

2. Решити Кошијев проблем

$$\begin{cases} 4u_t = u_{xx} \\ u(x, 0) = e^{-x^2} \sin x \end{cases}$$

3. Решити мешовити проблем

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} + 4u_x + e^{-2x} \cos^2 \pi x, & 0 < x < 1, \quad t > 0 \\ u(0, t) = 0 \\ u(1, t) = 0 \\ u(x, 0) = 0 \end{cases}$$